

**Приложение 2 к РПД Органическая химия**  
**Специальность- 21.05.04 Горное дело**  
**специализация: обогащение полезных ископаемых**  
**Форма обучения – заочная**  
**Год набора - 2017**

**ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

**1. Общие сведения**

1.	Кафедра	Общих дисциплин
2.	Специальность	21.05.04 Горное дело
3.	Специализация	Обогащение полезных ископаемых
4.	Дисциплина (модуль)	Органическая химия
5.	Форма обучения	заочная
6.	Год набора	2017

**2. Перечень компетенций**

- готовностью к с естественнонаучных позиций оценивать строение, химический и минералогический состав земной коры, морфологические особенности генетические типы месторождений твердых полезных ископаемых при решении задач по рациональному и комплексному освоению георесурсного потенциала недр (ОПК-4)
- владением методами рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала недр (ПК-2)
- способностью выбирать технологию производства работ по обогащению полезных ископаемых, составлять необходимую документацию (ПСК-6.2)

**Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования**

Этап формирования компетенции (разделы, темы дисциплины)	Формируемая компетенция	Критерии и показатели оценивания компетенций			Формы контроля сформированности компетенций
		Знать:	Уметь:	Владеть:	
<b>1. Номенклатура органических соединений</b>	ОПК-4 ПК-2 ПСК-6.2	Классификацию органических соединений, номенклатуру ЮПАК. Понятие изомерии, виды изомерии – структурная, геометрическая, оптическая изомерия. Понятие гомологического ряда органических соединений.	Дать название соединению, определить класс органических соединений, характерные виды изомерии	навыками использования номенклатуры	Задание на пользованием правилами номенклатуры органических соединений Групповая дискуссия

<b>2.. Алканы.</b>	ОПК-4 ПК-2 ПСК-6.2	Физические и химические свойства алканов	Объяснить механизмы реакции радикального замещения	Основными методами синтеза алканов	Задание написание уравнений реакций
<b>3.Алкены</b>	ОПК-4 ПК-2 ПСК-6.2	Физические и химические свойства алкенов. Механизм реакции электрофильного присоединения.	Распознавать реакции гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации, полимеризации алкенов.	Основными методами синтеза с участием алкенов	Задание написание уравнений реакций, определение геометрических изомеров
<b>4.Алкины..</b>	ОПК-4 ПК-2 ПСК-6.2	Номенклатура. Физические и химические свойства алкинов. Реакции присоеденения к кратной связи. Механизм реакции Кучерова	Объяснять кислотные свойства алкинов	Основными методами синтеза с участием алкинов	Задание написание уравнений реакций с участием алкинов,
<b>5.Галогеналканы.</b>	ОПК-4 ПК-2 ПСК-6.2	Номенклатура. Химические свойства. Реакции нуклеофильного замещения и элиминирования. Механизмы реакций галогеналканов	Определять направление реакции с участием галогеналканов – конкурирование реакций замещения и элиминирования	Составлением схемы синтеза с участием галогеналканов	Задание написание уравнений реакций с участием галогеналканов
<b>6.Арены.</b>	ОПК-4 ПК-2 ПСК-6.2	Номенклатура. Физические и химические свойства аренов. Механизм реакции электрофильного замещения.	Определять влияние заместителей при электрофильном замещении в ароматическое кольцо	Составлять схемы синтеза ароматических соединений – производных бензола	Задание написание уравнений реакций с участием ароматических углеводородов
<b>7.Спирты.</b>	ОПК-4 ПК-2 ПСК-6.2	Номенклатура. Физические и химические свойства алифатических и ароматических спиртов. Реакции с разрывом связи C=O.Кислотные свойства спиртов и фенолов	Объяснять кислотные свойства спиртов, обосновывать схему синтеза	Составлять схемы синтеза органических соединений	Задание на составление цепочки органических превращений
<b>8.Карбонильные соединения.</b>	ОПК-4 ПК-2 ПСК-6.2	Номенклатура. Физические и химические свойства альдегидов и кетонов. Реакции	Объяснять механизм реакции присоеденения по кратной связи C=O	Составлять схемы синтеза органических соединений	Задание на составление цепочки органических превращений

		нуклеофильного присоединения по связи C=O.			
<b>9.Карбоксильные соединения.</b>	ОПК-4 ПК-2 ПСК-6.2	Номенклатура. Физические и химические свойства карбоновых кислот.	Различать кислотный и щелочной гидролиз сложных эфиров. Понимать механизм реакции карбоновых кислот	Составлять схемы синтеза органических соединений	Задание на составление цепочки органических превращений
<b>10.Азотсодержащие органические соединения.</b>	ОПК-4 ПК-2 ПСК-6.2	Номенклатура. Физические и химические свойства алифатических и ароматических аминов.	Объяснить основность алифатических и ароматических аминов.	Составлять схемы синтеза органических соединений	Задание на составление цепочки органических превращений
<b>11. Основы органического синтеза.</b>	ОПК-4 ПК-2 ПСК-6.2	Правила безопасности при работе с органическими веществами,	Осуществлять планирование органического синтеза.	Навыками работы с лабораторной посудой, с органическими веществами	Задание на составление цепочки органических превращений Групповая дискуссия

## **1. Критерии и шкалы оценивания**

### **2.1.Решение задач**

7 баллов выставляется, если студент решил все рекомендованные задачи, правильно изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо).

5 баллов выставляется, если студент решил не менее 85% рекомендованных задач, правильно изложил все варианты решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо).

3 балла выставляется, если студент решил не менее 65% рекомендованных задач, правильно изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо).

0 баллов - если студент выполнил менее 50% задания, и/или неверно указал варианты решения.

### **2.2.Групповая дискуссия (устные обсуждения проблемы или ситуации)**

<b>Критерии оценивания</b>	<b>Баллы</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• обучающийся ориентируется в проблеме обсуждения, грамотно высказывает и обосновывает свои суждения, владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания, материал излагает логично, грамотно, без ошибок;</li><li>• при ответе студент демонстрирует связь теории с практикой.</li></ul>	4
<ul style="list-style-type: none"><li>• обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в проблеме обсуждения, владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности;</li><li>• ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный.</li></ul>	3
<ul style="list-style-type: none"><li>• обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не может доказательно обосновать свои суждения;</li><li>• обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала.</li></ul>	2


### **2.3.Работа на практических занятиях**

<b>Критерии оценивания</b>	<b>Баллы</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• обучающийся ориентируется в теме практического занятия, владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания, правильно отвечает на поставленные вопросы</li></ul>	4
<ul style="list-style-type: none"><li>• обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в практического занятия, владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности;</li><li>• ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный.</li></ul>	3
<ul style="list-style-type: none"><li>• обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не может полностью ответить на поставленный вопрос</li></ul>	2

- обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала.

**3. Типовые контрольные задачи и методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

**1. Дать название соединению по номенклатуре ЮПАК:**



**Методические указания для решения задачи 1:**

**Правила наименования органических соединений**

Международный союз теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) (IUPAC) рекомендовал для использования номенклатуру, получившую название *номенклатура ИЮПАК*. Система ИЮПАК является общепризнанной в мире. Названия по системе ИЮПАК образуются путем видоизменения названий насыщенных углеводородов. Все эти названия оканчиваются на "ан"; это окончание характерно для всех насыщенных углеводородов - алканов. Такой ряд соединений, в котором соседние члены отличаются на одну метиленовую группу ( $\text{CH}_2$ ), называется гомологическим рядом. Если из углеводорода удалить один атом водорода, полученная таким путем группа называется углеводородным радикалом; его название получают, заменяя в названии алкана окончание "ан" на "ил".

алкан		радикал	
$\text{CH}_4$	Метан	$\text{CH}_3 -$	Метил
$\text{C}_2\text{H}_6$	Этан	$\text{C}_2\text{H}_5 -$	Этил
$\text{C}_3\text{H}_8$	Пропан	$\text{C}_3\text{H}_7 -$	Пропил
$\text{C}_4\text{H}_{10}$	Бутан	$\text{C}_4\text{H}_9 -$	Бутил
$\text{C}_5\text{H}_{12}$	Пентан	$\text{C}_5\text{H}_{11} -$	Пентил
$\text{C}_6\text{H}_{14}$	Гексан	$\text{C}_6\text{H}_{13} -$	Гексил
$\text{C}_7\text{H}_{16}$	Гептан	$\text{C}_7\text{H}_{15} -$	Гептил
$\text{C}_8\text{H}_{18}$	Октан	$\text{C}_8\text{H}_{17} -$	Октил
$\text{C}_9\text{H}_{20}$	Нонан	$\text{C}_9\text{H}_{19} -$	Нонил
$\text{C}_{10}\text{H}_{22}$	декан	$\text{C}_{10}\text{H}_{21} -$	децил

**Основные правила наименования соединений по системе ИЮПАК:**

1. Находят самую длинную непрерывную цепь углеродных атомов в молекуле. Название соответствующего углеводорода используют как основу названия соединения.

2. Атомам (иным, чем водород) и группам вдоль этой цепи даются наименования, и эти наименования пишут перед названием основного углеводорода.


3. Атомы углерода основной углеводородной цепи нумеруют последовательно, начиная с конца, выбранного так, чтобы атомы углерода, несущие заместители, получили наиболее низкие номера.

4. Положения заместителей указывают числами перед названиями заместителей, обозначающими порядковые номера атомов углерода, к которым они присоединены.

5. Если имеется несколько одинаковых групп, перед их названием ставится приставка "ди", "три", "тетра",

6. Радикалы называются в алфавитном порядке.


Например:



2,2,4-триметилпентан

Двойные углерод-углеродные связи указывают суффиксом "ен" ("диен", если их две, и т.п.), а тройные - суффиксом "ин" ("диин" для двух и т.д.); при использовании этих суффиксов окончание "ан" опускают. Положение кратных связей обозначают порядковыми номерами углеродных атомов, подобно тому, как это делается для заместителей.

Например:



3-метилгекс-3-ен


Наименование сложных радикалов, как например,



|

осуществляется по следующим правилам:

- Углеродный атом со "свободной" связью получает номер 1;
- Самая длинная углеродная цепь, начиная с этого места, последовательно нумеруется и используется для основного названия (в приведенном примере - этан);
- С заместителями вдоль этой цепи поступают, как описано выше при наименовании соединений;
- Полное название сложного радикала заключают в скобки, чтобы избежать путаницы с номерами для остальной части молекулы.




4-(1-метил-2-хлорэтил)нон-4-ен.

Циклические углеводороды называют, прибавляя к названию углеводорода с прямой цепью приставку "цикло".


Ароматические углеводороды - арены. Первый член гомологического ряда – бензол имеет формулу  $\text{C}_6\text{H}_6$ :



Первый гомолог бензола — метилбензол, или толуол,  $\text{C}_7\text{H}_8$  не имеет изомеров положения, как и все однозамещённые производные:




Второй гомолог  $\text{C}_8\text{H}_{10}$ , может существовать в четырёх формах:




этилбензол


Или три диметилбензола или ксиола  $\text{C}_6\text{H}_4(\text{CH}_3)_2$ :



орт-ксилол  
или 1,2-, 1,3-, 1,4-диметилбензол




мета -ксилол



пара -ксилол

Радикал бензола  $C_6H_5-$  носит название фенил. Радикал  $C_6H_5-CH_2-$  называется бензил.


При образовании названия спиртов к названию соответствующего углеводорода (например алкана) суффикса -ол, положение гидроксильной группы указывается номером атома углерода, имеющего этот заместитель:



3-хлорпропанол-3.

При образовании названия альдегида к названию соответствующего алкана добавляется суффикс -аль, кетона – он.

## 2. Указать асимметрический атом углерода в соединении, нарисовать R- и S-изомеры этого соединения



### Методические указания к решению задачи 2:

#### Изомерия органических соединений

Изомеры – вещества, имеющие один и тот же состав, но разное строение, а, следовательно, и разные свойства. Для органических соединений существуют следующие типы изомерии:

I. Структурная изомерия, обусловленная различным взаимным расположением атомов в молекулах. При этом возможны следующие виды структурной изомерии:

1. Изометрия углеродного скелета. - обусловлена различным порядком соединения атомов углерода в цепи.

2. Изометрия положения кратных связей и функциональных групп.


Обусловлена различным положением кратных связей или функциональных групп при одной и той же углеродной цепи.

II. Пространственная изомерия (стереоизомерия).


Этот тип изомерии обусловлен различным пространственным расположением атомов при одинаковом порядке их связывания.

Геометрическая изометрия или цис-, транс- изомерия.

Характерна для непредельных органических соединений, содержащих двойную связь. Так, например, молекула бутена-2 существует в виде двух геометрических изомеров:



*цик-бутен-2*




*транс-бутен-2*

### III. Оптическая изометрия


Существуют органические соединения, имеющие одинаковый состав, одинаковое строение и свойства, но по-разному относящиеся к плоскополяризованному свету. Так, при пропускании через такие соединения луча поляризованного света происходит отклонение плоскости поляризации на определенный угол.

Соединения, которые вращают плоскость поляризации, называют **оптически активными**. Изомеры различаются по направлению вращения плоскости поляризации (*R*- и *S*-изомеры). Такие изомеры называются **оптическими, или зеркальными изомерами (энантиомерами)**.

Оптическая изомерия обусловлена наличием **асимметрического** атома углерода  $\text{C}^*$ , связанного с четырьмя различными заместителями.




*S*-изомер



*R*-изомер

### 3. Осуществить превращения:



### Методические указания к задаче 3:

#### Механизмы реакций органических соединений


#### Реакции алканов (реакции радикального замещения *S<sub>r</sub>*)

В молекулах алканов связи С-Н пространственно более доступны для атаки другими частицами, чем менее прочные связи С-С. В определенных условиях происходит разрыв именно С-Н-связей и осуществляется замена атомов водорода на другие атомы или группы атомов.




#### Галогенирование

Галогенирование алканов – реакция замещения одного или более атомов водорода в молекуле алкана на галоген. Продукты реакции называют галогеналканами или галогенопроизводными алканов. Реакция алканов с хлором и бромом идет на свету или при нагревании.

#### Хлорирование метана:




При достаточном количестве хлора реакция продолжается дальше и приводит к образованию смеси продуктов замещения 2-х, 3-х и 4-х атомов водорода:





Реакция галогенирования алканов протекает по радикальному цепному механизму, т.е. как цепь последовательных превращений с участием свободно-радикальных частиц.

Механизм радикального замещения:

– *зарождение цепи* – появление в зоне реакции свободных радикалов. Под действием световой энергии гомолитически разрушается связь в молекуле Cl:Cl на два атома хлора с неспаренными электронами (свободные радикалы)  $\square\text{Cl}\cdot$ :




– *рост (развитие) цепи*. Свободные радикалы, взаимодействуя с молекулами, порождают новые радикалы и развивают цепь превращений:



– *обрыв цепи*. Радикалы, соединяясь друг с другом, образуют молекулы и обрывают цепь превращений:




При хлорировании или бромировании алкана с вторичными или третичными атомами углерода легче всего идет замещение водорода у третичного атома, труднее у вторичного и еще труднее у первичного:



### **Нитрование алканов**

На алканы действует разбавленная азотная кислота при нагревании и давлении. В результате происходит замещение атома водорода на остаток азотной кислоты – нитрогруппу  $\text{NO}_2$ . Этую реакцию называют реакцией нитрования, а продукты реакции – нитросоединениями.

Схема реакции:




### **Реакции алкенов (реакции электрофильного присоединения Ade)**

Алкены вступают в разнообразные реакции присоединения.

Алкен	Реагент	Продукт	Вид реакции
$-\overset{\text{—}}{\underset{\text{—}}{\text{C}}}=\overset{\text{—}}{\underset{\text{—}}{\text{C}}}-$	+ $\text{H}_2$	$\begin{array}{c}   &   \\ -\overset{\text{—}}{\underset{\text{H}}{\text{C}}}-\overset{\text{—}}{\underset{\text{H}}{\text{C}}}- \end{array}$	Гидрирование (восстановление)
$-\overset{\text{—}}{\underset{\text{—}}{\text{C}}}=\overset{\text{—}}{\underset{\text{—}}{\text{C}}}-$	+ $\text{Br}_2$	$\begin{array}{c}   &   \\ -\overset{\text{—}}{\underset{\text{Br}}{\text{C}}}-\overset{\text{—}}{\underset{\text{Br}}{\text{C}}}- \end{array}$	Галогенирование (бромирование)
$-\overset{\text{—}}{\underset{\text{—}}{\text{C}}}=\overset{\text{—}}{\underset{\text{—}}{\text{C}}}-$	+ $\text{HCl}$	$\begin{array}{c}   &   \\ -\overset{\text{—}}{\underset{\text{H}}{\text{C}}}-\overset{\text{—}}{\underset{\text{Cl}}{\text{C}}}- \end{array}$	Гидрогалогенирование (гидрохлорирование)
$-\overset{\text{—}}{\underset{\text{—}}{\text{C}}}=\overset{\text{—}}{\underset{\text{—}}{\text{C}}}-$	+ $\text{H}_2\text{O}$	$\begin{array}{c}   &   \\ -\overset{\text{—}}{\underset{\text{H}}{\text{C}}}-\overset{\text{—}}{\underset{\text{OH}}{\text{C}}}- \end{array}$	Гидратация
$n (-\overset{\text{—}}{\underset{\text{—}}{\text{C}}}=\overset{\text{—}}{\underset{\text{—}}{\text{C}}}-)$	катализатор	$(-\overset{\text{—}}{\underset{\text{—}}{\text{C}}}-\overset{\text{—}}{\underset{\text{—}}{\text{C}}}-)_n$	Полимеризация


## *Галогенирование (присоединение галогенов)*

Присоединение галогенов по двойной связи C=C происходит легко в обычных условиях (при комнатной температуре, без катализатора). Например, быстрое обесцвечивание красно-буровой окраски раствора брома в воде (бромной воды) служит качественной реакцией на наличие двойной связи:




Эти реакции протекают по механизму электрофильного присоединения с гетеролитическим разрывом связей в молекуле галогена.

При нагревании до 500°C возможно радикальное замещение атома водорода при соседнем к двойной связи атоме углерода:




## *Гидрогалогенирование (присоединение галогеноводородов)*



Реакция идет по механизму электрофильного присоединения с гетеролитическим разрывом связей. Электрофилом является протон  $H^+$  в составе молекулы галогеноводорода  $HX$  ( $X$  - галоген).

## Механизм электрофильного присоединения



Направление реакции присоединения галогеноводородов к алканам несимметричного строения (например, к пропилену  $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$ ) определяется правилом Марковникова:


В реакциях присоединения полярных молекул типа  $\text{HX}$  к несимметричным алкенам водород присоединяется к более гидрогенизированному атому углерода при двойной связи (т.е. атому углерода, связанному с наибольшим числом атомов водорода).

Так, в реакции  $\text{HCl}$  с пропиленом из двух возможных структурных изомеров 1-хлорпропана и 2-хлорпропана, образуется последний:




Возможно протекание реакции присоединения к алкенам против правила Марковникова. Так, если реакция присоединения идет не по электрофильному, а по радикальному механизму. Реакция  $\text{HBr}$  с пропиленом в присутствии пероксидов ( $\text{H}_2\text{O}_2$  или  $\text{R}_2\text{O}_2$ ), образующих свободно-радикальные частицы ( $\text{HO}^\bullet$  или  $\text{RO}^\bullet$ ), происходит по радикальному механизму и идет против правила Марковникова.

#### **Гидратация (присоединение воды)**



Гидратация происходит в присутствии минеральных кислот по механизму электрофильного присоединения:




#### **Реакции алкинов**

##### **реакции присоединения к алкинам (Ade)**

###### **Гидрирование**


В присутствии металлических катализаторов (Pt, Ni) алкины присоединяют водород с образованием алкенов (разрывается первая  $\text{C}\equiv\text{C}$ -связь), а затем алканов (разрывается вторая  $\text{C}\equiv\text{C}$ -связь):



При использовании менее активного катализатора гидрирование останавливается на стадии образования алкенов.

###### **Галогенирование**


Электрофильное присоединение галогенов к алкинам протекает медленнее, чем для алкенов.



Алкины обесцвечивают бромную воду (качественная реакция).


###### **Гидрогалогенирование**

Присоединение галогеноводородов также идет по электрофильному механизму. Продукты присоединения к несимметричным алкинам определяются правилом Марковникова:




###### **Гидратация (реакция Кучерова)**

Присоединение воды происходит в присутствии катализатора соли ртути (II) и идет через образование неустойчивого непредельного спирта, который изомеризуется в уксусный альдегид (в случае ацетилена):




или в кетон (в случае других алкинов):



### Кислотные свойства алкинов. Образование солей

Ацетилен и его гомологи с концевой тройной связью  $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$  (алкины-1) вследствие полярности связи  $\text{C}(\text{sp})-\text{H}$  проявляют слабые кислотные свойства: атомы водорода могут замещаться атомами металла. При этом образуются соли – *ацетилениды*:



При взаимодействии ацетилена (или  $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$ ) с аммиачными растворами оксида серебра или хлорида меди (I) выпадают осадки нерастворимых ацетиленидов:



Образование белого осадка ацетиленида серебра (или красно-коричневого – ацетиленида меди  $\text{RC}\equiv\text{CCu}$ ) служит *качественной реакцией* на концевую тройную связь.


Ацетилениды разлагаются при действии кислот:




### Реакции аренов (реакции электрофильного замещения Sr)

#### Галогенирование


Замещение атома водорода в бензольном кольце на галоген происходит в присутствии катализаторов (кислот Льюиса):



#### Схема реакции хлорирования бензола




Роль катализатора – образование электрофила  $\text{Cl}^+$ :




#### Нитрование


Бензол реагирует с нитрующей смесью (смесью концентрированных азотной и серной кислот):



### Схема реакции нитрования бензола



Роль серной кислоты - образование электрофила  $\text{NO}_2^+$




### Алкилирование (реакция Фриделя-Крафтса)


Замещение атома водорода в бензольном кольце на алкильную группу (*алкилирование*) происходит под действием алкилгалогенидов или алканов в присутствии катализаторов (кислот Льюиса):




### Схема реакции алкилирования бензола



Роль катализатора - образование электрофила  $\text{CH}_3^+$ :



### Алкилирование бензола алканами



### Реакции спиртов

#### Реакции по связи O–H

К наиболее характерным реакциям гидроксисоединений, идущим с разрывом связи O–H, относятся:


- реакции замещения атома водорода на металл (кислотные свойства);
- реакции замещения атома водорода на остаток кислоты (образование сложных эфиров);
- реакции отщепления водорода при окислении и дегидрировании.

Реакционная способность **одноатомных** спиртов в реакциях по связи O–H:


$\text{CH}_3\text{OH} >$  первичные  $>$  вторичные  $>$  третичные.

#### Кислотные свойства спиртов


Одноатомные спирты реагируют с активными металлами (Na, K, Mg, Al и др), образуя соли - алкоголяты (алкоксиды):



Алкоголяты под действием воды полностью гидролизуются с выделением спирта и гидроксида металла:



Спирты – более слабые кислоты, чем вода, т.к. алкильный радикал, проявляя  $+I$ -эффект, повышает электронную плотность на атоме кислорода и уменьшает полярность связи O–H. Поэтому при взаимодействии спиртов со щелочами алкоголяты практически не образуются:




### *Реакции по связи C–O*

Наиболее характерные реакции гидроксисоединений, происходящие с разрывом связи C–O:

- реакция замещения OH-группы на галоген или другую нуклеофильную группу ( $RO^-$ ,  $NH_2^-$  и т.п.), идущая по механизму нуклеофильного замещения  $S_N$ ;
- реакция отщепления (элиминирования) OH и H от соседних атомов углерода (внутримолекулярная дегидратация спиртов – образование алканов);
- реакция замещения группы OH при разрыве связи C–O в одной молекуле и замещения атома H с разрывом связи O–H – в другой молекуле гидроксисоединения (межмолекулярная дегидратация – образование простых эфиров).


### *Реакции замещения OH-группы*

Замещение гидроксила OH на галоген происходит в реакции спиртов с галогеноводородами в присутствии катализатора – сильной минеральной кислоты (например, конц.  $H_2SO_4$ ). При этом спирты проявляют свойства слабых оснований.



Нуклеофил – хлорид-анион  $Cl^-$  – замещает группу  $HO^-$ :


При межмолекулярной дегидратации спиртов также происходит нуклеофильное замещение: OH-группа в одной молекуле спирта замещается на группу OR другой молекулы.




### *Реакции дегидратации спиртов*

Отщепление воды от молекул спирта (дегидратация спиртов) в зависимости от условий происходит как **внутримолекулярная** или **межмолекулярная** реакция.

Внутримолекулярная дегидратация спиртов с образованием алканов идет в присутствии концентрированной серной кислоты при нагревании выше 140 °C. Например:




В тех случаях, когда возможны 2 направления реакции, например:



дегидратация идет преимущественно в направлении I, т.е. по правилу Зайцева – с образованием более замещенного алкена (водород отщепляется от менее гидрогенизированного атома углерода).

Межмолекулярная дегидратация спиртов происходит при температуре ниже 140 °C с образованием простых эфиров:




### Реакции альдегидов и кетонов

Для карбонильных соединений характерны реакции различных типов:

- присоединение по карбонильной группе;
- полимеризация;
- конденсация;
- восстановление и окисление.

Большинство реакций альдегидов и кетонов протекает по механизму нуклеофильного присоединения ( $\text{A}_N$ ) по связи  $\text{C}=\text{O}$ .


Реакционная способность в таких реакциях уменьшается от альдегидов к кетонам:



### Реакции присоединения по карбонильной группе

Присоединение большинства реагентов по двойной связи  $\text{C}=\text{O}$  происходит как ионная реакция по механизму нуклеофильного присоединения  $\text{A}_N$


Присоединение циановодородной (сианильной) кислоты  $\text{HCN}$ :



Эта реакция используется для удлинения углеродной цепи, а также для получения  $\alpha$ -гидроксикислот  $\text{R}-\text{CH}(\text{COOH})\text{OH}$  по реакции:




Присоединение спиртов с образованием полуацеталей (в присутствии кислоты или основания как катализатора):



**Полуацетали** - соединения, в которых атом углерода связан с гидроксильной и алcoxильной (-OR) группами.

Взаимодействие полуацетала с еще одной молекулой спирта (в присутствии кислоты) приводит к **замещению** полуацетального гидроксила на алcoxильную группу OR' и образованию ацетала:



4. Нарисовать структурную формулу соединения:

**Примерные контрольные вопросы к экзамену:**

1. Номенклатура органических соединений ЮПАК.
2. Понятие изомерии. Виды изомерии органических соединений – структурная, геометрическая, оптическая.
3. Алканы, номенклатура, свойства. Механизм реакции свободнорадикального замещения  $S_R$ .
4. Алкены, номенклатура, свойства. Механизм реакции электрофильного присоединения  $Ad_E$ . Правило Марковникова.
5. Алкины, номенклатура, свойства. Присоединение к тройной связи  $Ad_E$ . Реакция Кучерова. Кислотные свойства алкинов.
6. Ароматические углеводороды, номенклатура, свойства. Механизм реакции электрофильного замещения в ароматическое кольцо  $S_E$ . Влияние заместителей на ориентацию при  $S_E$
7. Галогеналканы. Механизм нуклеофильного замещения  $S_N$ . Механизм реакции элиминирования Е. Конкурирование реакций  $S_N$  и Е.
8. Спирты, номенклатура, свойства. Реакция дегидратации (реакция элиминирования Е). Кислотные свойства спиртов.
9. Карбоновые кислоты, номенклатура, свойства. Реакция этерификации. Влияние заместителей на силу карбоновых кислот.
10. Альдегиды, кетоны, номенклатура, свойства. Механизм реакции нуклеофильного присоединения  $Ad_N$ . Альдольная конденсация.
11. Амины, номенклатура, свойства. Основность аминов.

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ**  
**ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА**  
**21.05.04 Горное дело**  
**Специализация №6 «Обогащение полезных ископаемых»**

(код, направление ,направленность ( профиль))

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА**

Шифр дисциплины по РУП		<b>Б1.В.ОД.6</b>
Дисциплина		<b>Органическая химия</b>
Курс	<b>2,3</b>	семестр <b>4-5</b>
Кафедра		<b>Общих дисциплин</b>
Ф.И.О. преподавателя, звание, должность		<b>Митрофанова Галина Викторовна, доцент</b>
Общ. трудоемкость час/ЗЕТ	<b>108/3</b>	Кол-во семестров <b>2</b>
Форма контроля	<b>экзамен</b>	
ЛК общ./тек. сем.	<b>14/14</b>	ПР/СМ общ./тек. сем.
	<b>8/8</b>	ЛБ общ./тек. сем.
	-	CRC общ./тек. сем.
		<b>77/77</b>

**Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:**

- - готовностью к с естественнонаучных позиций оценивать строение, химический и минералогический состав земной коры, морфологические особенности генетические типы месторождений твердых полезных ископаемых при решении задач по рациональному и комплексному освоению георесурсного потенциала недр (ОПК-4)
- владением методами рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала недр (ПК-2)
- способностью выбирать технологию производства работ по обогащению полезных ископаемых, составлять необходимую документацию (ПСК-6.2)

Код формируемой компетенции	Содержание задания	Количество мероприятий	Максимальное количество баллов	Срок предоставления
<i><b>Вводный блок</b></i>				
Не предусмотрен				
<i><b>Основной блок</b></i>				
ОПК-4 ПК-2 ПСК-6.2	Групповая дискуссия	2	8	Во время сессии
ОПК-4 ПК-2 ПСК-6.2	Работа на практических занятиях	6	24	Во время сессии
ОПК-4 ПК-2 ПСК-6.2	Решение задач	1	28	Во время сессии
	<b>Всего:</b>	<b>60</b>		
	Экзамен	Вопрос 1	20	По расписанию
		Вопрос 2	20	
	<b>Всего:</b>	<b>40</b>		
	<b>Итого:</b>	<b>100</b>		
<i><b>Дополнительный блок</b></i>				
Не предусмотрен				

Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов, «зачтено» - 61-100 баллов.